


## Uppslagstabell för diagnosticering av parodontala förhållanden på patientnivå



| Intakt parodontium    | Frisk<br>① | Gingivit<br>② |
|-----------------------|------------|---------------|
| Klinisk fästeförlust  | Nej        | Nej           |
| Sonderade fickdjup *  | ≤3 mm      | ≤3 mm         |
| BOP                   | <10%       | ≥10%          |
| Benförlust på röntgen | Nej        | Nej           |

| Reducerat parodontium, icke-parodontit | Frisk<br>① | Gingivit<br>② |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| Klinisk fästeförlust                   | Ja         | Ja            |
| Sonderade fickdjup *                   | ≤3 mm      | ≤3 mm         |
| BOP                                    | <10%       | ≥10%          |
| Benförlust på röntgen                  | Möjligt    | Möjligt       |

| Behandlad parodontit med stabila förhållanden | Frisk<br>③ | Gingivit hos individ med parodontiterfarenhet<br>④ |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Klinisk fästeförlust                          | Ja         | Ja                                                 |
| Sonderade fickdjup *                          | ≤4 mm ^    | ≤3 mm                                              |
| BOP                                           | <10%       | ≥10%                                               |
| Benförlust på röntgen                         | Ja         | Ja                                                 |

\* Exklusive pseudofickor

^ Inget fickdjup ≥ 4 mm med blödning vid sondering

| Patient med parodontit | <del>Frisk</del> | Parodontit |
|------------------------|------------------|------------|
|------------------------|------------------|------------|

För patienter med parodontit väljs utbredning, stadium och grad enligt separat uppslagstabell